

FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Ciflufenamid. (Equivalente a 52.3 g de i.a. / L a 20°C)	5.10
Ingredientes inertes: Solvente, emulsificantes, anticongelante, conservador y dispersante.	94.90
Total:	100.0

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0308C-X0217-345-5.10



**”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AQUÍ RECOMENDADOS”**
“INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Dosis y cultivos

Se recomienda el uso de **KATSU 5% EW** en los cultivos que se indican a continuación y para el control de las siguientes enfermedades:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Pepino, melón, calabacita, sandía, chayote. (0)	Cenicilla de las cucurbitáceas (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	200 mL/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, volumen de aplicación 261 – 361 L de agua/ha.

Berenjena, chile, tomate verde, okra, jitomate, pimiento morrón (0)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	200 mL/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 293 –393 L de agua/ha.
Vid (3)	Cenicilla (<i>Uncinula necator</i>)	300 mL/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación 500 –600 L de agua/ha.
Arándano Fresa (0)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae</i>)	200 mL/ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, el volumen de de aplicación dependerá del estado fenológico de la planta y del equipo de aplicación para asegurar una buena cobertura.
Manzano (14)	Cenicilla (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	40 mL/100 L de agua	Realiza una aplicación al follaje cuando se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad.

() **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, gire la tapa y desprenda el sello de seguridad. En un recipiente agregue agua hasta la mitad de su capacidad, vierta lentamente dosis recomendadas agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme sin dejar de agitar hasta llegar al volumen deseado.

KATSU 5% EW se puede utilizar con agua en volúmenes convencionales por hectárea para aplicaciones terrestres, asegúrese de tener una buena cobertura y contar con un buen equipo de agitación en el equipo.

CONTRAINDICACIONES.

No aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima a la aplicación que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD.

KATSU 5% EW no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

Se ha demostrado la compatibilidad de **KATSU 5% EW** con formulaciones en emulsión aceite en agua, suspensiones concentradas y concentrados emulsionables; pero si desea mezclar, la mezcla debe hacerse con productos registrados y en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA.

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **SUMMIT AGRO MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec

C.P. 11580 Ciudad de México. Tel. (55) 5279-4340

www.summitagromexico.com.mx